

Fig. 1

2/14




Fig. 2

3/14




Fig 3

Fig. 7.6. γ rays from ^{60}Co and ^{137}Cs .


24)

Unit: micrometer

-Rev.3

Hong Chen, AP&T,
SSPG, Quantum Corp.

3/2/99



5/14




Fig 5

09718818 110200

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100




Fig 6

7/14




Fig. 7

0948818-11200




Fig. 8 Combined Attenuator and Power Monitor

9/14




Fig 9

03931310




Fig. 10

11/14





Fig. 11 Use of a segmented mirror to create 4 beams of equal intensity


12/14

Fig. 12

Side View



Top View



532nm




Fig. 13 Generation of multiple parallel beams by the combined use of a segmented mirror and a birefringent crystal plate



145